

Strategie laboratorního testování onemocnění COVID-19

Indikace, úhrady a omezení indikace, stav k 7.7. 2020

Název testu	Typ testu	Význam testu	Indikace	Úhrada	Dostupnost v ČR	Poznámka
Rapid test	Imunochromatografický serologický test, protilátkový kvalitativní průkaz (IgM, IgG, total)	Screening	<p style="text-align: center;"><u>Screeningová indikace:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Rizikové skupiny obyvatel v ohnisku nákazy Pracovně lékařské služby 	<ol style="list-style-type: none"> bez úhrady testu, úhrada odběru hrazeno ZP bez úhrady testu, úhrada odběru zaměstnavatelem 	Ano	úhrada ze ZP pouze v době platnosti mimořádného opatření MZCR/KHS, v případě zrušení MO, úhrada nebude realizovaná ze strany ZP
RT-PCR, LAMP	Molekulárně-diagnostický test - přímý průkaz SARS-CoV-2 LAMP je obdobou PCR testu.	Diagnostický - potvrzení nemoci, preventivní vyšetření v rizikové populaci	<p style="text-align: center;"><u>Diagnostická indikace:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Akutní pacient s příznaky onemocnění COVID -19, podezření z nákazy, epidemiologicky významné kontakty (tj. včetně bezpříznakových kontaktů) <p style="text-align: center;"><u>Preventivní indikace:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Asymptomatický pacient s klinicky závažnými rizikovými faktory (KZRF)* před poskytnutím zdravotních služeb (viz. Odborné doporučení KS COVID)* 	<ol style="list-style-type: none"> hrazeno ZP, (event. KHS) hrazeno ZP, indikace ošetřující lékař akutní lůžkové péče a vybraných odborností (VPL, PLDD, ORL, INFL, PNEUFTIZ) hrazeno ZP pouze v ohnisku nákazy, v ostatních případech zřizovatelem v případě ohniska hrazeno ZP (KHS), jinak hradí zaměstnavatel/zřizovatel samoplátce samoplátce/zaměstnavatel samoplátce/zaměstnavatel 	Ano	1-3. indikuje ošetřující lékař akutní lůžkové péče nebo ambulantní lékař vybraných odborností (VPL, PLDD, ORL, INFL, PNEUFTIZ) nebo KHS

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Příjem nového klienta pobytových sociálních služeb v ohnisku nákazy z vlastního sociálního prostředí 4. Vyšetření zaměstnanců zdravotních nebo sociálních služeb v ohnisku nákazy 5. Přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři) 6. Zahraniční pracovníci v ČR 7. Návrat ze zahraničí z rizikové oblasti 			4. indikuje KHS/VPL/PL DD
ELISA	Chemiluminiscenční metoda – kvantitativní serologický test	Sérologická a epidemiologická diagnostika	<p><u>Diagnostická indikace:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dárce rekonvalescentní plazmy 2. Stanovení vnímavosti, ověření stavu imunity u pacienta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. hrazeno ZP, indikuje INFL, nebo hematolog 2. hrazeno ZP, indikuje IMUNO, INFL, (EPI v ohnisku nákazy) 	Ano	Výkon 82097, diagnóza U07.1 U069.75 (Max 6x měsíčně, max. 3x za den.)
Virus neutralizační test	Kultivační průkaz neutralizace viru protilátkami pacienta in vitro	Diagnostika nemoci a průkaz neutralizačních protilátek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dárcovství rekonvalescentní plazmy 2. Ukončení karantény u osob dlouhodobě nebo opakovaně vylučujících virus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Možnost indikace u dárců rekonvalescentní plazmy 2. Indikováno u osob opakovaně a dlouhodobě PCR pozitivních 	Ano, na specializovaných pracovištích s BSL3 režimem	
Covid-19 Ag FIA	Metoda fluorescenční imunochromatografie, detekce antigenu Covid-19	Diagnostika nemoci	Dosud nestanoveno	nehrazeno	NE	
POC-RNA	Kvalitativní, rychlá detekce RNA	Diagnostický- v případě časové naléhavosti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akutní pacient s příznaky onemocnění COVID -19, podezření z nákazy. 	Hrazeno ZP -indikuje lékař odbornosti INF, ARO, urgentní medicína	ANO	(vyšetření STATIM)

Vysvětlivky zkratk:

RT = rapid test; **ZP** = zdravotní pojištění; **VPL** = všeobecné praktické lékařství; **PLDD** = praktické lékařství pro děti a dorost; **ORL** = otorinolaryngologie; **INFL** = infekční lékařství; **PNEUFIZ** = pneumologie a ftizeologie **IMUNO**=imunolog

***KZRF** = klinicky závažné rizikové faktory, které by mohly v případě klinického rozvoje nákazy COVID-19 ovlivnit zásadním způsobem konečný výsledek poskytované zdravotní péče (např. pacienti s hemato-onkologickým onemocněním, pacienti s radioterapií nebo chemoterapií, pacienti léčení imunosupresivy, pacienti s těžkou obezitou s BMI nad 40 kg/m², pacienti se závažným onemocněním ledvin a jater, závažnou plicní chorobou, dekompenzovaným diabetem anebo nekontrolovanou hypertenzí, pacienti podstupující rozsáhlý operační výkon s plánovanou pooperační péčí na pracovišti typu ARO/JIP apod.). Za pacienty se ZRF by neměli být považováni pacienti s dobře kompenzovaným chronickým onemocněním postihující kardiovaskulární systém, dýchací systém, metabolismus apod. Blíže viz. **Stanovisko KS-COVID k testování COVID-19 bezpříznakových pacientů před přijetím k hospitalizaci, před léčebnými výkony a v souvislosti s překlady mezi poskytovateli zdravotní péče**

RT-PCR = real time polymerase chain reaction; **POC** = point of care test